



PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń:

1. **Leki przyjmowane z powodu chorób przewlekłych**, w dniu badania rano powinny zostać przyjęte i popite niewielką ilością wody.
2. **Chorujący na cukrzyce** powinni poinformować o tym fakcie rejestrację oraz dodatkowo skonsultować sposób przygotowania do badania z lekarzem prowadzącym.
NIE należy przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych, jeśli równocześnie nie są spożywane pokarmy. W przypadku kolonoskopii należy pominąć również dawkę wieczorną poprzedniego dnia.
3. **Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi:**
 - **nie odstawiać** preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Acesan)
 - **odstawić w dniu poprzedzającym badanie oraz pominąć poranną dawkę leku w dniu badania** leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana)
 - **w tygodniu poprzedzającym badanie należy oznaczyć INR** jeżeli pacjent przyjmuje leki z grupy doustnych antykoagulantów (Acenokumarol, Warfaryna). Jeśli wynik jest w przedziale 2-3, to nie należy modyfikować dawek leków; jeśli wyższy należy postępowanie skonsultować z lekarzem.

W przypadku osób z dużym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, po zawałach serca, po udarach optymalnym postępowaniem jest skonsultowanie postępowania z lekarzem. W przypadku potrzeby wykonania większego zabiegu endoskopowego np. usuwania polipów może, pomimo zastosowania się do przedstawionych powyżej ogólnych zasad, zaistnieć **konieczność powtórzenia zabiegu** po modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego (np. u osób stosujących Acenokumarol, Warfarynę przestawienie na leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi).
4. **Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią** powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób przygotowania do badania.
5. Prosimy o przyniesienie i **okazanie lekarzowi przed badaniem** posiadanej dokumentacji medycznej np. opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, USG jamy brzusznej.
6. Osoby wymagające **okularów do czytania** proszone są o zabranie ich ze sobą.
7. Wyznaczona, orientacyjna **godzina rozpoczęcia badania może ulec przesunięciu**, ponieważ czas trwania badań endoskopowych jest trudny do przewidzenia.

**W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WSKAZANA JEST KONSULTACJA
Z LEKARZEM KIERUJĄCYM NA BADANIE.**