



ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE GASTROSKOPII

Imię i nazwisko _____

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adres _____

Numer telefonu _____

Co to jest gastroskopia?

Gastroskopia jest metodą diagnostyczną oceniającą przełyk, żołądek i dwunastnicę. Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem wykonania dodatkowych badań mikroskopowych oraz testu w kierunku infekcji *Helicobacter pylori*. Obecnie brak jest innego badania o podobnych możliwościach diagnostycznych.

Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na lewym boku. Wcześniej należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu zakładany jest plastikowy ustnik. Następnie wprowadza się do jamy ustnej i gardła gastroskop o średnicy około 1cm, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykowego. Moment ten może być nieprzyjemny i dawać uczucie duszenia; wymaga współpracy pacjenta z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut i jest w niewielkim stopniu nieprzyjemne ale w zasadzie bezbolesne, podobnie, jak pobieranie wycinków. Instrument służący do badania jest każdorazowo specjalnie dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się jednorazowymi kleszczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

Powikłania gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz.

Powikłania gastroskopii

- przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego, zwłaszcza przełyku (zdarza się w około 0,05% badań) wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego,
- krwawienie, głównie po pobraniu wycinków – najczęściej jest leczone w trakcie badania, bardzo rzadko wymaga leczenia operacyjnego,
- bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, takich jak zaostrenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca.

Postępowanie po badaniu

Z powodu miejscowego znieczulenia gardła przez 2 godziny po badaniu nie wolno spożywać żadnych posiłków ani przyjmować płynów, aby uniknąć zadławienia.

Proszę także poinformować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin będziecie Państwo odczuwać silne bóle jamy brzusznej, bądź zaobserwujecie czarny stolec. Wystąpienie innych niejasnych dla Pani/Pana objawów należy również niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi		TAK	NIE
1	Czy jest Pani/Pan na coś uczulona (leki, pokarmy, jod, pyłki, środki chemiczne)?		
2	Czy choruje Pani/Pan na choroby wątroby ?		
3	Czy przyjmuje Pan/Pani leki przeciwkrzepliwe (Aspiryna, Polocard, Sintrom, Acenocumarol, Heparyna)?		
4	Czy używa Pan/Pani protez stomatologicznych?		
5	Czy jest Pani/Pan na czczo?		
6	Czy jest Pani w ciąży?		

Oświadczenie

Oświadczam, iż udzieliłem/am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania lekarza odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków oraz przebytych zabiegów.

Zgoda na proponowaną procedurę medyczną.

Zostałem/zostałam poinformowany/a o potrzebie wykonania powyższego badania/zabiegu endoskopowego, zasadach, celowości i sposobie przeprowadzenia oraz ewentualnych następstwach proponowanej procedury diagnostycznej i leczniczej. W przypadku powikłań lub stwierdzenia nowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zabiegiem zgadzam się na rozszerzenie zakresu zabiegu zarówno metodami endoskopowymi jak i chirurgicznymi . Miałem możliwość zadania pytań lekarzowi, na które otrzymałem zadowolające odpowiedzi.

Po zapoznaniu się z przedstawioną mi informacją dotyczącą zabiegu wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (*niepotrzebne skreślić) na wykonanie gastrokopii, biopsji i innych niezbędnych zabiegów: _____

Podpis pacjenta: _____

Podpis lekarza udzielającego informacji: _____

Wołomin dnia _____